

ITER OPERATIVO PER GESTIONE DEI SINTOMI SOSPETTI COVID19



a cura della dott.ssa Laura POLES

incontro del 26/3/21 con maestre scuola Infanzia VITTUONE

FEBBRE:

- Se maggiore di 37.5° con o senza altri sintomi → allontanamento dell'alunno.
- Se minore di 37.5° con sintomatologia respiratoria, gastrointestinale, vascolare o cutanea



Cefalea:

- Bambino che soffre spesso di cefalea → nessun intervento *
- Bambino senza storia di cefalee → Tenere in osservazione e provare la febbre

Starnuti e congestione nasale:

- Muco acquoso, starnuti ripetuti, prurito occhi e naso → probabile allergia *
- Muco denso giallo, starnuti, cefalea fronto-orbitale → probabile raffreddamento
- Muco denso, trasparente, starnuti violenti → provare febbre, se <37.5 osservazione

Tosse:

- Tosse catarrosa, grassa sin da subito → probabile bronchite
- Tosse secca, affannosa, fischiante in espirio → tosse asmatica*
- Tosse secca, stizzosa, "di gola" → provare febbre, se <37.5 osservazione

Mal di gola:

- Se accompagnato a tosse secca → provare febbre e valutare allontanamento
- Se isolato → provare febbre, se <37.5 osservazione

Vomito e diarrea:

- Se presenti entrambi → probabile gastroenterite infettiva: valutare allontanamento
- Se vomito o diarrea isolati → se accompagnati da astenia e malessere: osservazione

Manifestazioni cutanee e vascolari:

- Esantema → probabile malattia infettiva, valutare allontanamento
- Dito rosso, gonfio, violaceo → provare febbre, valutare allontanamento
- Manifestazioni cutanee anomale → provare febbre, se >37.5 allontanamento

N.B. Se presenti almeno due sintomi, soprattutto se di 'pertinenze' diverse (respiratorie, cutanee, gastroenteriche..) predisporre allontanamento del bambino.

*valutare dati anamnestici del bambino, approfondire con i genitori